




Fenoliseren

Behandeling volwassenen

Libra

REVALIDATIE
AUDIOLOGIE



Als het leven een nieuwe balans vraagt

U heeft klachten die veroorzaakt worden door een verhoogde spierspanning of hinderlijke reflexen. De revalidatiearts behandelt u hiervoor met injecties: fenoliseren. In deze folder leest u meer over deze behandeling.

Wat is fenoliseren?

Fenoliseren komt van het woord fenol. Fenol is een stof die een zenuw of deel van een spier gedeeltelijk buiten werking stelt. De zenuw geeft dan minder prikkels door aan een spier of de spier trekt minder samen.

Wanneer komt u voor deze behandeling in aanmerking?

Als u in het dagelijkse leven beperkt wordt door

- verhoogde spierspanning (spasticiteit);
- hinderlijke reflexen (clonus).

De verhoogde spierspanning veroorzaakt pijn of geeft problemen bij bijvoorbeeld het aantrekken van een trui of het lopen. Hinderlijke reflexen beperken u doordat uw hand of voet op onverwachte momenten gaat trillen.

Fenoliseren kan worden toegepast als enige behandeling of in combinatie met medicijnen of botuline toxine. Daarnaast kan fysiotherapie zinvol zijn en/of het dragen van een spalk.

De behandeling

Met behulp van een elektro-stimulatieapparaat of echoapparaat zoekt de revalidatiearts aan de buitenkant van uw arm of been naar de spier of zenuw waar de injectie gezet moet worden. Hierna volgt de injectie en spuit de arts de vloeistof in de zenuw. Met elektrostimulatie kunt u een lichte prikkeling in uw arm of been ervaren.

Het inspuiten zelf kan gepaard gaan met een licht brandend gevoel, maar is doorgaans pijnloos. De behandeling duurt meestal zo'n 30 minuten.

Hoe lang werkt de injectie?

Door de behandeling neemt de prikkelbaarheid van de spier af. De werkingsduur is drie tot twaalf maanden. Dit verschilt per persoon. De behandeling kan herhaald worden.

Proefbehandeling

Wanneer de arts niet zeker weet wat het effect van een fenoliseren zal zijn, kan hij ervoor kiezen een proefbehandeling te geven. In plaats van fenol wordt dan een verdovingsmiddel (lidocaine / marcaine) ingespoten. Het effect hiervan duurt slechts enkele uren. Maar de arts kan zo wel bekijken of fenoliseren voor u een gunstig effect zal hebben.

Bijwerkingen van fenol / lidocaine / marcaine

Mogelijke bijwerkingen zijn:

- enkele uren pijn op de plaats van de injectie;
- pijn in het gebied van de zenuw die is behandeld; deze pijn is branderig van karakter en meestal tijdelijk;
- de huid van het verzorgingsgebied van de zenuw wordt tijdelijk gevoelloos;
- bij behandeling van het onderbeen worden de enkels tijdelijk dikker door het vasthouden van vocht;
- uiterst zeldzaam: een posttraumatische dystrofie;
- overgevoeligheid voor fenol.

Meer informatie

Deze folder is een aanvulling op de mondelinge informatie van uw behandelaar. Heeft u nog vragen of mist u informatie? Neem dan contact op met uw behandelaar of kijk op onze website www.libranet.nl.

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Aantekeningen:

Aantekeningen:

Aantekeningen:

Libra

REVALIDATIE
AUDIOLOGIE



LIBRA REVALIDATIE

Toledolaan 2
5629 CC Eindhoven

Vogelsbleek 1
6001 BE Weert

Prof. Stoltehof 3
5022 KE Tilburg

Nieuwstraat 70
5691 AG Son

Kinder- en jongerencentrum Leijpark
Professor van Buchemlaan 20
5022 KB Tilburg

www.libranet.nl

088 313 20 00

